

# IRIX<sup>®</sup>

## tetrahidrozolina clorhidrato 0,5 mg/ml

Colirio – Vía oftálmica tópica

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

PharmaDorf<sup>®</sup>

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O CON SU FARMACÉUTICO.**

### COMPOSICIÓN

Cada mililitro contiene:

Tetrahidrozolina, clorhidrato 0,5 miligramos.

Excipientes: Edetato disódico; Cloruro de benzalconio; Ácido bórico; Borato de sodio decahidratado; Cloruro de sodio; Agua destilada. NO USAR SI EL FRASCO Y/O LA TAPA NO ESTÁN INTACTOS.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Descongestivo ocular (ojo).

### USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

Irix<sup>®</sup> está indicado para el alivio temporario del malestar y el enrojecimiento, debido a irritaciones oculares leves, las cuales pueden ser debidas por ejemplo al humo, al polvo, al agua clorada, a la luz (solar, rayos ultravioletas, neón, televisión), a las corrientes de aire, a los

cosméticos, a las lentes de contacto, etc.

### Como usar este medicamento

**Adultos:** 1 a 2 gotas en cada ojo afectado, hasta cuatro veces al día.

Irix<sup>®</sup> Gotas oftálmicas está indicado solo en adultos.

El efecto descongestivo aparece inmediatamente luego de la aplicación de las gotas y se mantiene de 4 a 6 horas.

### Modo de administración

Para la correcta colocación de las gotas se sugiere el siguiente procedimiento:

Con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, separar los párpados, dirigir la vista hacia arriba y colocar una gota dentro del párpado inferior, dirigiendo enseguida la vista hacia abajo. Mantener abierto el o los ojos tratados, sin parpadear, durante 30 segundos. Si fuese necesario, aplicar de igual forma la segunda gota. Luego parpadear normalmente.

El orificio del frasco gotero no debe tocar el ojo ni tocarse con los dedos.

Si utiliza lentes de contacto debe quitárselos antes de la aplicación de Irix<sup>®</sup> y luego de quince minutos puede volver a colocarlos.

Después de cada aplicación cierre correctamente el envase.

Un mismo envase no debe ser utilizado por más de una persona.

Descartar después de un mes de abierto.

**"SI LOS SÍNTOMAS DE DISCONFORT O ENROJECIMIENTO PERSISTEN POR MÁS DE 24 HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO".**

### CONTRAINDICACIONES

Alergia a los componentes del medicamento.

Si padece de glaucoma, conjuntivitis.

### ADVERTENCIAS

Sólo para uso externo.

Si se presenta dolor a nivel ocular, cambios súbitos en la visión; aparición de manchas tipo "moscas" en el campo visual, incremento de la irritación o si la afección persiste luego de 24 horas de tratamiento, suspenda la aplicación y consulte al oftalmólogo.

**"No utilice este medicamento si la solución evidencia un cambio de color."**

### PRECAUCIONES

No utilizar este producto si usted padece hipertensión arterial, enfermedades del corazón, diabetes y/o hipertiroidismo.

Si Ud. esta tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

### REACCIONES ADVERSAS

Puede producir picazón o ardor ocular. Ocasionalmente se han descrito cefaleas, mareos, temblor, palpitaciones o insomnio. En estos casos se deberá suspender el tratamiento.

Este producto puede aumentar la presión ocular.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Si usted toma antidepresivos (IMAO).

Si está medicado por hipertensión arterial, diabetes u otra enfermedad crónica, consulte a su médico antes de usar este producto, dado que puede interactuar con los medicamentos que usted está tomando.

### SOBREDOSIFICACIÓN

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 / 2247.

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.

### PRESENTACIÓN

Envases con 15 ml.

### MODO DE CONSERVACIÓN

Conservar a una temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.

MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL, NO DEBE UTILIZARSE DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

### MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51.111

Elaborado en: Lab. Pablo Cassará, Carhué 1096, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Dirección Técnica: Carla Tizzoni, Farmacéutica.

### Pharmadorf S.A.

Virrey Loreto 3878, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

### ¿Tiene usted alguna pregunta?

www.pharmadorf.com.ar.

ANMAT Responde: 0800 333 1234.

Aprobado por Disposición N° 6902 (11oct11).

6608000810-01-0120  
Pharmacode 2650  
302650

	Nombre	Firma	Fecha	Observaciones
Pack. Dev. PROD.				
PLANING				
Q.C.				
Q.A.				
MKTG.				
D.T.				

### COLOR

AZUL PANTONE REFLEX BLUE CVC  
CORTANTE

<b>PharmaDorf<sup>®</sup></b>		<b>Producto:</b> Irix Colirio	<b>Tipo:</b> Chambril o similar
Fecha 2abr2020	Versión: 03	<b>Material:</b> Prospeto	<b>Gramaje:</b> 57 grs
Escala 1:1	6608000810-01-0120	<b>Medida:</b> 140x140 mm	<b>Colores:</b> 1 color Reflex Blue
		Cod barras: n/a Pharmacode: 2650	Código visual: 302650